

## Дезинфицирующее средство «Део-Хлор» в таблетках

Дезинфицирующее средство представляет собой таблетки массой 3,4 грамма со слабым запахом хлора, содержащие в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, а также специальные функциональные добавки. Содержание активного хлора в средстве  $44,5 \pm 4,5\%$ . При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 грамма активного хлора. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении: бактерий; вирусов; грибов и плесеней. Дезинфицирующее средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; средство малотоксично (4 класс опасности) при парентеральном введении, при введении в брюшную полость — к 4 классу малотоксичных веществ (классификация К. К. Сидорова). Пары средства при ингаляционном воздействии мало опасны (4 класс по степени летучести). Не обладает сенсibiliзирующим, кожно-резорбтивным и кумулятивным действием. Специфические отдаленные эффекты (эмбриотропный, ганадотропный, мутагенный и канцерогенный) у средства не выявлены. Рабочие растворы средства при однократном воздействии не оказывают местнораздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз; при многократном воздействии могут вызвать сухость и шелушение кожи и раздражение слизистых оболочек глаз. ПДК хлора в воздухе рабочей зоны — 1,0 мг/ (пары). ПДК хлора в атмосферном воздухе населенных мест максимально-разовая — 0,1 мг/ ; среднесуточная — 0,03 мг/ .

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ**

Рабочие растворы готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующих количеств таблеток (таблица 1) в питьевой воде комнатной температуры до полного их растворения. Для приготовления моющего-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (5 г моющего средства на 1 л раствора или 50 г на 10 л раствора).

### **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Поверхности в помещениях (пол, стены, подоконники и пр.), жесткую мебель, оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на , или орошают из помповых распылителей из расчета , или орошают из аэрозольных распылителей из расчета 10 мл/ . По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей не требуется. После применения рабочих растворов средства методом орошения с помощью помповых или аэрозольных распылителей помещение необходимо проветривать в течение 30 минут.

Таблица: Режимы дезинфекции различных объектов растворами дезинфицирующего средства

№ п/п	Возбудители инфекционных заболеваний	Концентрация рабочих растворов, %	Время (мин)	Способ применения средства
Поверхности				
1	Бактерии	0,0075	60	Протирание, орошение с помощью аэрозольных распылителей
2	Вирусы	0,015	45	
3	Грибы	0,06	60	
4	Микобактерии	0,075	45	